

시설내의 기준작물 증발산량 산정모형의 개발

이남호

(한경대학교 농학부 농공학과)

A Model for Estimating of Reference Crop Evapotranspiration in the Greenhouse

Nam-Ho Lee

Dept. of Rural Engineering, Faculty of Agriculture, Hankyong National University

작 요

본 연구의 목적은 시설 내에서의 관개시설의 계획 및 운영에 활용할 수 있는 기초자료를 제공하기 위해서 온실 내에서 잔디를 이용하여 기준작물 증발산량을 측정하고, 온실의 환경인자들의 기준작물 증발산량에 대한 영향을 분석하고, 기준작물 증발산량을 추정 할 수 있는 모형을 개발하는데 있다. 기준작물로는 한지용인 Kenturky Blue Grass가 사용되었고 온실 내 전체 면적에 잔디가 식재되었다. 기준작물의 증발산량은 라이시메타를 이용하여 매일 측정되었다. 강우, 풍속, 온도, 습도, 일사량, 증발계증발량과 같은 환경인자 등이 측정되었다.

기준작물 증발산량은 기상인자들에 의해 영향을 받는데 그 영향의 정도는 계절별로 변화하는 것으로 나타났는데 기상인자들 중에서 가장 큰 영향을 미치는 인자는 습도이고 그 다음으로는 기온, 일사량의 순으로 나타났다. 온실내부의 환경인자인 증발계 증발량은 기상인자들 보다 매우 높은 상관성을 갖는 것으로 나타났다. 노지의 기준작물의 일증발산량 산정모형인 Penman 공식은 온실내 증발산량의 변화를 잘 나타내지 못하고, 월증발산량 산정모형인 Blaney-Criddle 공식은 실측치 보다 높은 값을 보이나 비슷한 변화 형태를 보이고 있다. 다중회귀분석 결과에 의해 선정된 기준작물 증발산량 산정모형은 사용 가능한 것으로 나타났다.

키워드 : 기준작물 증발산량, 시설내 증발산량, 라이시메타, 온실

I. 서론

시설재배의 중요성에 대한 인식이 고조되면서 시설재배면적이 증가되고 있는데, 이와 같은 시설재배의 양적인 증가에 맞추어 질 높은 생산기술이 요구되고 있다. 온실 내에서 작물을 재배하는 것은 가장 집약적인 농업생산활동의 하나이고 이의 생산기반은 거의 인공적이거나 인간에 의해 만들어지는 특성을 갖고 있다. 따라서 인위적인 환경조절이 생산량을 결

정하는 직접적인 요인으로 작용하고 있는데, 이들 환경요인 중에서 적정 토양수분의 유지는 식물의 일차적인 생존과 관련되어 있다. 시설재배를 위한 관개는 노지재배와 같이 우선 강우량을 이용하고 부족되는 보충수를 공급한다는 개념과 달리 필요한 전량의 물을 공급해야 한다는 측면에서 더욱 적절한 관리가 요구된다.

비료를 물과 동시에 공급하는 경우에 부적절한 물관리는 물과 비료의 과다-과소 사용에 따른 경제적 환경적 문제를 야기 할 수 있다. 따라서 적절한 물관



Fig. 1. 실험온실전경 및 종합기상장치




Fig. 2. 실험온실 내부



Fig. 3. 실험에 사용된 라이시메타

리가 이루워 지기 위해서는 재배작물에 적합한 증발산량이 규명되고 이에 의해 적절한 관개가 이루어지는 것이 중요하다. 또한 정확한 증발산량의 예측은 사설재배를 위한 관개용수원의 규모 결정, 관개시설의 규모결정 및 이들의 운영관리에 필수적이다. 노지재배를 위한 증발산량산정에는 많은 연구결과들이 제시되어 오고 있으나 노지와는 작물의 생육환경이 다른 시설내에서의 증발산량에 관한 연구는 매우 적다.

노지의 증발산량을 추정하기 위해서는 일반적으로 잔디나 알파파를 기준작물로 한 증발산량과 작물별 작물계수를 이용하고 있다. 노지에 대한 기준작물 증발산량은 Blaney & Criddle, Penman, Doorenbos & Pruitt, Hargreaves, Jensen & Haje(Doorenbos, J., and

W. O. Pruitt, 1977)등에 의해서 그 추정방법들이 제시되었고 또한 국내외 적으로 많은 작물에 대한 작물계수들이 제시되고 있다.

시설재배에 의한 증발산량은 일부 실측된 예가 있으나 시설환경이나 재배방식들을 고려해서 정량적으로 파악된 예는 거의 찾아 볼 수 없다. 시설재배가 발달된 일본의 경우에는 토마토, 메론, 오이, 상추, 샐러드 및 화훼 등에 대한 생육 시기별 평균일 증발산량과 증발산비 등이 제시되고 있다(鶴田福也, 1997). 우리 나라의 경우는 혀(1997)는 시설내 환경요인과 오이의 증발산량과의 관계를 조사하여 회귀 모형을 개발한 바있고, 남 등(1998)은 시설재배 상추 및 오이의 재배방식 및 생육단계별 증발산량을 실측조사하였다. 특히 국내외 적으로 시설 내에서의 증발산량을 추정하기 위한 기준작물 증발산량의 개념이 도입된 적이 없는 실정이다.

본 연구는 시설 내에서의 관개시설의 계획 및 운영에 활용할수 있는 기초자료를 제공하기 위해서 온실 내에서 잔디를 이용하여 기준작물 증발산량을 측정하고 이를 추정 할 수 있는 모형을 개발하는데 그 목적이 있다.

II. 재료 및 방법

본 연구는 경기도 안성시에 위치한 한경대학교 농촌공학과의 PE 온실(Fig.1 참조)이 사용되었다. 기준




Fig. 4. 기온과 기준작물 증발산량과의 관계

작물로는 한지용인 Kentucky Blue Grass가 사용되었는데 Fig. 2와 같이 온실 전면적에 걸쳐 잔디가 식재되었다. 기준작물의 증발산량은 Fig. 3과 같은 라이시메타를 이용하여 매일 오전 10시에 1회 측정되었다. 기준작물의 증발산량과 외부환경인자와 내부환경인자의 관계규명을 환경인자들이 측정되었는데, 외부환경인자로는 강우, 풍속, 온도, 습도, 일사량, 증발계증발량이 내부환경인자로는 온실내의 온도, 습도, 일사량, 증발계증발량 등이 측정되었다. 실험은 1999년 3월 1일부터 2000년 2월 28일까지 실시되었다.

실측한 기준작물의 증발산량에 대한 각 환경인자의 영향을 분석하여 중요한 환경인자를 도출하기 위해서 계절별 환경인자별 상관분석을 실시하였다. 기준작물 증발산량의 추정을 위한 모형을 개발하기 위해서 환경인자들을 고려한 다중회귀분석이 이루어졌고 이를 토대로 하여 통계모형이 선정되었다. 또한 추후 개발 예정인 전산모형의 구성에 필요한 기초자료로 활용하기 위하여 현재 개발되어 노지의 기준작물 증발산량의 산정에 사용되고 있는 공식들의 적용 가능성을 검토하였다.

III. 결과 및 고찰

1. 환경인자와 실측 기준작물 증발산량과의 관계

가. 기온

온실내부의 기온이 기준작물 증발산량에 미치는 영향을 분석한 결과는 Fig. 4에 도시되었다. (a)~(d)

은 봄, 여름, 가을, 겨울기간 동안의 변화를 보여주고 있는데, 봄 기간의 기온이 R^2 가 0.49로 가장 높은 상관성을 보이고 그 다음으로는 겨울, 가을, 여름 순으로 상관성을 나타내고 있다. 여름에는 R^2 가 0.02를 나타내고 있는데 이는 온실내부의 온도가 25~32°C의 범위 내에 주로 형성되고 있는 반면에 증발산량은 0~9mm/day의 나타내고 있어 온도의 영향이 거의 없는 것으로 나타났다. 연구기간 1년간의 온도의 영향은 R^2 가 0.49로서 상당한 정도로 상관관계가 있는 것으로 보인다.

나. 습도

온실내부의 습도가 기준작물 증발산량에 미치는 영향을 분석한 결과는 Table 1과 Fig. 5에 도시되었다. Table 1에서 보면 봄기간의 습도가 R^2 가 0.81로 가장 높은 상관성을 보이고 그 다음으로는 가을, 여름, 겨울 순으로 상관성을 나타내고 있다. 겨울에는 R^2 가 0.03을 나타내고 있는데 전기간의 습도의 영향은 R^2 0.71로서 매우 높은 상관관계를 보이고 있다. 습도의 증가에 따라서 증발산량의 감소가 나타나고 있다.

다. 일사량

Table 1과 Fig. 6에서 보면 기온과 습도의 경우와 마찬가지로 봄기간에 R^2 가 0.83으로 가장 높은 상관성을 보이고 그 다음으로는 여름, 겨울, 가을 순으로 상관성을 나타내고 있다. 가을에는 R^2 가 0.05로 낮은 상관성을 나타내고 있고 전기간의 일사량의 영향은 R^2 0.41의 상관관계를 보이고 있다.

Table 1. 계절별 환경인자와 기준작물 증발산량과의 상관분석 결과(R^2)

계절별	기온	습도	일사량	증발계증발량
봄	0.489	0.812	0.829	0.923
여름	0.02	0.683	0.366	0.815
가을	0.229	0.711	0.051	0.575
겨울	0.269	0.025	0.297	0.529
전기간	0.491	0.714	0.414	0.810




Fig. 5. 습도와 기준작물 증발산량과의 관계




Fig. 6 일사량과 기준작물 증발산량과의 관계




Fig. 7 증발계증발량과 기준작물 증발산량과의 관계




Fig. 8 Penman공식에 의한 추정증발산량과 기준작물증발산량과의 관계




Fig. 9 Blaney-Criddle식과 내부기상을 이용한 추정 순별증발산량




Fig. 10 Blaney-Criddle식과 외부기상을 이용한 추정 순별증발산량

라. 증발계증발량

Table 1에서 보면 기온, 습도 및 일사량의 경우와 마찬가지로 봄기간에 R^2 가 0.92로 가장 높은 상관성을 보이고 그 다음으로는 여름, 가을, 겨울 순으로 상관성을 나타내고 있다. 계절별로 결정계수가 0.53~0.92로 대체적으로 높은 상관성을 전기간의 영향은 R^2 0.81로 환경인자 중에서 가장 높은 값을 보이고 있다. Fig. 7에 분석결과가 도시되어있다.

2. 노지의 기준작물 증발산량 산정공식의 적용

기존의 노지작물의 증발산량 산정에 널리 쓰이고 있는 Penman공식과 Blaney-Criddle 공식의 시설 작물의 증발산량 산정에 적용 가능한지를 검토하였다. Penman 공식은 온실내부의 기상인자들 만으로는 적용할 수 없어 외부기상자료들을 사용하였고, Blaney-Criddle 공식의 적용에는 내부기상과 외부기상 자료가 각각 사용되었다.

가. Penman 공식의 적용

본 연구에서는 FAO 수정 Penman 공식이 사용되었고 기상자료는 시험포장에 설치된 종합기상장치에서 측정된 값과 안성시 농업기술관리센타에서 측정된 값을 사용하였다. Penman 공식과 기상자료를 이용하여 증발산량을 추정하고 이를 실측 기준작물 증발산량과 비교한 결과를 Fig. 8에 도시하였다. Penmann 공식에 의한 추정결과의 RMS오차는 1.2mm/day로 나타났다.

나. Blaney-Criddle 공식의 적용

실측된 온실내부 및 외부 기상자료자료를 이용하고 SCS수정 Blaney-Criddle 공식을 사용하여 순별 일평균 증발산량을 계산하고 그결과를 Fig. 9와 Fig. 10에 도시하였다. Fig. 9는 온실내부의 기상인자를 사용하여 모의발생한 순별 일평균 증발산량을 실측 기준작물 증발산량과 비교한 것이고, Fig. 10은 외부기상인자를 사용한 결과이다. 외부기상인자를 사용한 모의발생 결과가 내부인자를 사용한 결과 보다 더 실측치에 접근하는 것으로 나타났는데, 모의발생한 결과는 모두 실측치 보다 높게 나타났다.

3. 기준작물 증발산량 산정모형의 개발

실측한 기준작물의 증발산량과 각종 내부기상인자를 이용하여 기준작물 증발산량 산정모형을 개발하기 위해서 다중회귀분석을 실시하였다. 분석은 계절별로 실시되었는데 그 결과는 Table 2와 같다. Table에서 보면 기상인자로 기온, 습도, 일사량을 고려한 모형이 가장 적합한 것으로 나타났다. 다중회귀분석 결과에 의한 통계모형은 다음 식과 같다.

$$ET_{ref} = 0.069T - 0.162H + 0.015R_a + 11.015 \quad (1)$$

여기서, ET_{ref} = 기준작물 증발산량(mm/day)

T = 일평균 기온($^{\circ}\text{C}$)

H = 일평균 상대습도(%)

R_a = 일평균 일사량(Kw/m^2)

Table 2. 계절별 환경인자와 기준작물 증발산량과의 관계

계절별	기온+습도	습도+일사량	기온+일사량	기온+습도+일사량
봄	0.797	0.770	0.782	0.821
여름	0.544	0.564	0.359	0.570
가을	0.728	0.702	0.235	0.728
겨울	0.226	0.284	0.398	0.418
전기간	0.694	0.665	0.426	0.700




Fig. 11 추정증발산량과 기준작물 증발산량과의 관계

(1)식과 기상자료를 이용하여 증발산량을 모의발생한 결과는 Fig. 11과 같으며 이때 RMS오차는 0.85mm/day였다.

IV. 결론

본 연구는 시설 내에서의 관개시설의 계획 및 운영에 활용할 수 있는 기초자료를 제공하기 위해서 온실 내에서 잔디를 이용하여 기준작물 증발산량을 측정하고, 온실의 환경인자들의 기준작물 증발산량에 대한 영향을 분석하고, 기준작물 증발산량을 추정 할 수 있는 모형을 개발하는 것을 목적으로 실시되었는데 그 연구 결과를 요약하면 다음과 같다.

- 기준작물 증발산량은 기상인자들에 의해 영향을 받는데 그 영향의 정도는 계절별로 변화하는 것으로 나타났다.
- 기상인자들 중에서 기준작물 증발산량에 가장 큰 영향을 미치는 인자는 습도이고 그 다음으로는 기온, 일사량의 순으로 나타났다.
- 온실내부의 환경인자인 증발계 증발량은 기상인 자들 보다 매우 높은 상관성($R^2=0.81$)을 갖는 것으로 나타났다.
- 노지의 기준작물의 일증발산량 산정모형인 Penman 공식은 온실내 증발산량의 변화를 잘 나타내지 못하고, 월증발산량 산정모형인 Blaney-Criddle 공식은 실측치 보다 높은 값을 보

이나 비슷한 변화 형태를 보이고 있다.

- 다중회귀분석 결과에 의해 선정된 기준작물 증발 산량 산정모형은 사용 가능한 것으로 나타났다.

참고문헌

- 김문기외(1997), 원예시설의 환경설계기준 작성 연구, 농어촌진흥공사.
- 남상운, 이남호, 전우정, 황한철, 홍성구, 허연정 (1998), “시설재배 상추 및 오이의 재배방식별 증발산량”, 한국생물생산시설환경학회 6(3): 168~175.
- 정현교, 이기명, 박규식(1996), “경북지역 현대화 원예시설의 관리실태 조사분석”, 한국생물생산시설환경학회 5(2): 174~186.
- 허노열(1997), “시설내 원예작물의 합리적인 물 관리”, 시설원예 관수와 시비기술 심포지엄: 57 ~103.
- 鶴田福也(1997), “원예시설내의 수분순환과 소비특성”, 시설원예 관수와 시비기술 심포지엄: 25~41.
- Aldrich, R. A. and Bartok, J. W.(1992), Greenhouse engineering, NRAES-33, p.212.
- Doorenbos, J., and W. O. Pruitt(1977), Guidelines for predicting crop water requirements, Irrigation and Drainage paper 24, FAO, United Nations.
- NRAES(1994), Greenhouse systems : automation, culture, & environment, Proc. greenhouse systems international conference, New Jersey, July 20~22, 1994, p.301.
- Reed, D. W.(1996), Water, media, nutrition for greenhouse crops, Ball Publishing, p.1~29.
- Weiler, T. C.(1996), Water and nutrient management for greenhouse, NRAES-56, p.102